

VoWen®-T



Tabletten zum Einnehmen

Wirkstoffe:

Aconitum napellus Trit. D6; Capsicum annum Trit. D4; Chamomilla recutita Trit. D1; Echinacea purpurea Trit. D1; Hydrargyrum bichloratum Trit. D8; Hydrastis canadensis Trit. D4; Iodum Trit. D4; Natrium tetraboracicum Trit. D4; Sambucus nigra Trit. D1; Sanguinaria canadensis Trit. D2.

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss VoWen®-T jedoch vorschriftsmäßig eingenommen werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder nach 2 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist VoWen®-T und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von VoWen®-T beachten?
3. Wie ist VoWen®-T einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist VoWen®-T aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS IST VoWen®-T UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Homöopathisches Arzneimittel

VoWen®-T ist ein registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen holen Sie bitte medizinischen Rat ein.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON VoWen®-T BEACHTEN?

VoWen®-T darf nicht eingenommen werden

- von Säuglingen unter 1 Jahr.
- bei Überempfindlichkeit gegen einen der Wirk- oder Hilfsstoffe, gegen Kamille, Sonnenhut oder gegen Korbblütler.
- in Schwangerschaft und Stillzeit.

– aus grundsätzlichen Erwägungen bei fortschreitenden Systemerkrankungen wie Tuberkulose, Leukämie bzw. Leukämie-ähnlichen Erkrankungen, entzündlichen Erkrankungen des Bindegewebes (Kollagenosen), Autoimmunerkrankungen, Multipler Sklerose, AIDS-Erkrankung, HIV-Infektion oder anderen chronischen Viruserkrankungen.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von VoWen®-T ist erforderlich

- bei Schilddrüsenerkrankungen.
- bei bestehenden Lebererkrankungen oder solchen in der Vorgeschichte, oder bei gleichzeitiger Anwendung leberschädigender Stoffe.

In diesen Fällen soll VoWen®-T nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Bei Einnahme von VoWen®-T mit anderen Arzneimitteln:

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind nicht bekannt.

Bei Einnahme von VoWen®-T zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken:

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Schwangerschaft und Stillzeit:

Fragen Sie vor der Einnahme/Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

In Schwangerschaft und Stillzeit darf VoWen®-T nicht angewendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von VoWen®-T:

Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie VoWen®-T erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

3. WIE IST VoWen®-T EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie VoWen®-T immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Erwachsene nehmen bei **akuten Zuständen** alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 x täglich, je 1 Tablette, bei **chronischen**

Verlaufsformen 1-3 x täglich je 1 Tablette ein.

Kinder zwischen 6 und 12 Jahren erhalten 4 x täglich je 1 Tablette bei **akuten Zuständen**, 1-2 x täglich je 1 Tablette bei **chronischen Verlaufsformen**.

Kleinkinder vom 1. bis zum 6. Lebensjahr erhalten 3 x täglich je 1 Tablette bei **akuten Zuständen**, 1 x täglich je 1 Tablette bei **chronischen Verlaufsformen**.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.

Dauer der Anwendung:

Das Arzneimittel sollte ohne ärztlichen Rat nicht länger als 8 Wochen eingenommen werden.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann VoWen®-T Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem Behandelten auftreten müssen.

Mögliche Nebenwirkungen:

In Einzelfällen können Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten. Für Arzneimittel mit Zubereitungen aus Sonnenhut wurden Hautausschlag, Juckreiz, selten Gesichtsschwellung, Atemnot, Schwindel und Blutdruckabfall beobachtet.

Ferner kann nach Anwendung erneut Speichelfluss auftreten.

In diesem Fall ist das Mittel abzusetzen.

Hinweis:

Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Meldung von Nebenwirkungen:

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, 53175 Bonn, Website: <http://www.bfarm.de> anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. WIE IST VoWen®-T AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett/Umkarton unter <verw. bis> angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Aufbewahrungsbedingungen:

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Dauer der Haltbarkeit nach Anbruch: 6 Monate.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was VoWen®-T enthält:

Die Wirkstoffe sind:

1 Tablette enthält:

Aconitum napellus Trit. D6 20 mg; Capsicum annuum Trit. D4 20 mg; Chamomilla recutita Trit. D1 20 mg; Echinacea purpurea Trit. D1 20 mg; Hydrargyrum bichloratum Trit. D8 20 mg; Hydrastis canadensis Trit. D4 20 mg; Iodum Trit. D4 20 mg; Natrium tetraboracicum Trit. D4 20 mg; Sambucus nigra Trit. D1 20 mg; Sanguinaria canadensis Trit. D2 20 mg.

Die sonstigen Bestandteile sind: Magnesiumstearat; Maisstärke.

Wie VoWen®-T aussieht und Inhalt der Packung:

VoWen®-T ist eine runde, glatte, flache, schwach gelbliche Tablette.

Packungsgrößen: 50 und 100 Tabletten.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Weber & Weber GmbH

Herrschinger Str. 33, 82266 Inning/Ammersee

Telefon: 08143 927-0, Fax: 08143 927-270

www.weber-weber.de

information@weber-weber.net

Weitere Angaben:

Apothekenpflichtig

Reg.-Nr. 25449.00.00

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im März 2026.

Weitere Informationen zur Anwendung:

Liebe Patientin, lieber Patient, wir freuen uns, dass Sie sich für VoWen®-T entschieden haben.

VoWen®-T gehört zu den registrierten homöopathischen Arzneimitteln ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Die Anwendung erfolgt daher individuell nach therapeutischer Verordnung.

VoWen®-T ist bereits für die Anwendung bei Kleinkindern ab 1 Jahr geeignet.

Hierfür empfehlen wir, die Tablette auf einem Teelöffel in Wasser leicht zu zerdrücken und dem Kleinkind die so aufbereitete Tablette direkt in den Mund zu geben.